

# *Introdução à Probabilidade*


Silvia Shimakura

*silvia.shimakura@ufpr.br*

---

---

# *Probabilidade*



- **O que é probabilidade?**

Medida que quantifica a incerteza frente a um acontecimento futuro

- **Como quantificar incerteza?**

- Definição Clássica
  - Definição Frequentista
- 
-

# *Espaço amostral e Eventos*

- **Experimento 1:** Lançamento de um dado **balanceado**
- **Espaço amostral:** conjunto de todos os resultados possíveis

$$E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

- **Evento A:** número par

$$A = \{2, 4, 6\}$$

---

---

# Tipos especiais de eventos

- **Evento complementar de A:** elementos de E que não estão em A

$$E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad A = \{2, 4, 6\} \quad A^c = \{1, 3, 5\}$$

- **Evento interseção:** elementos estão em A e B

$$A = \{2, 4, 6\} \quad B = \{4, 5, 6\} \quad A \cap B = \{4, 6\}$$

- **Evento união:** elementos que estão em A ou B

$$A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$$

---

---

# *Tipos especiais de eventos*

- **Eventos mutuamente exclusivos:** não existem elementos comuns em A e B

$$A = \{2, 4, 6\} \quad A^c = \{1, 3, 5\} \quad A \cap A^c = \emptyset$$



# Propriedades de Probabilidade

- $0 \leq P(A) \leq 1$ , para qualquer evento  $A$
- $P(E) = 1$ , em que  $E$  é o espaço amostral
- $P(A^c) = 1 - P(A)$
- Para dois eventos  $A$  e  $B$  quaisquer, a probabilidade de  $A$  ou  $B$  ocorrer:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

- Se  $A$  e  $B$  são mutuamente exclusivos, a probabilidade de  $A$  ou  $B$  ocorrer:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

---

---

# Definição Clássica de Probabilidade

- Se os elementos de  $E$  forem **equiprováveis** a probabilidade de um evento  $A$  ocorrer:

$$P(A) = \frac{\text{número de elementos em } A}{\text{número de elementos em } E}$$

- **Experimento 1:**  $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \rightarrow$  6 elementos (equiprováveis)
  - **Evento A:**  $A = \{2, 4, 6\} \rightarrow P(A) = 3/6$
- 
-

# Definição Clássica de Probabilidade

- Evento complementar de  $A$ :

$$A^c = \{1, 3, 5\} \rightarrow P(A^c) = 3/6 = 1 - P(A)$$

- Evento interseção:

$$A \cap B = \{4, 6\} \rightarrow P(A \cap B) = 2/6$$

- Evento união:

$$A \cup B = \{2, 4, 5, 6\} \Rightarrow P(A \cup B) = 4/6 =$$

$$= P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

3/6

3/6

2/6



# Probabilidade condicional

- $P(A|B) = P(\text{A ocorrer dado que B ocorreu})$

- Para A e B quaisquer:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- Para A e B independentes:  $P(A|B) = P(A)$

$$P(A \cap B) = P(A|B)P(B) = P(A)P(B)$$

# Experimento 2: Lançamento de dois dados não viciados

- Espaço amostral:

$E = \{(1,1), (1,2), \dots, (1,6), (2,1), (2,2), \dots, (2,6), \dots, (6,6)\}$

36 elementos  $\rightarrow$  equiprováveis com prob  $1/36$  cada

- Evento  $A$ : soma dos dados é 8

- $A = ?$

- $P(A) = ?$
- 
-

# Experimento 2: Lançamento de dois dados não viciados

- Espaço amostral:

$E = \{(1,1), (1,2), \dots, (1,6), (2,1), (2,2), \dots, (2,6), \dots, (6,6)\}$

36 elementos  $\rightarrow$  equiprováveis com prob  $1/36$  cada

- Evento  $A$ : soma dos dados é 8

- $A = \{(2, 6), (6, 2), (3, 5), (5, 3), (4, 4)\}$

- $P(A) = ?$



# Experimento 2: Lançamento de dois dados não viciados

- Espaço amostral:

$E = \{(1,1), (1,2), \dots, (1,6), (2,1), (2,2), \dots, (2,6), \dots, (6,6)\}$

36 elementos  $\rightarrow$  equiprováveis com prob  $1/36$  cada

- Evento  $A$ : soma dos dados é 8

- $A = \{(2, 6), (6, 2), (3, 5), (5, 3), (4, 4)\}$

- $P(A) = 5/36$



## *Experimento 2: Lançamento de dois dados não viciados*

- **Espaço amostral:** 36 elementos com prob  $1/36$  cada
- **Evento A:** soma dos dados é 8
- $A = \{(2, 6), (6, 2), (3, 5), (5, 3), (4, 4)\}$
- $P(A) = 5/36$

Se soubermos que o resultado no primeiro dado é 3, qual será a probabilidade da soma dos dois dados ser 8?

---

---

## Experimento 2 (cont.)

- Evento A:

$$A = \{(2, 6), (6, 2), (3, 5), (5, 3), (4, 4)\} \rightarrow P(A) = 5/36$$

- Evento B: primeiro dado é 3

$$B = \{(3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6)\} \rightarrow P(B) = 6/36$$

- Evento interseção:

$$A \cap B = \{(3, 5)\} \rightarrow P(A \cap B) = 1/36$$

- $P(A|B) = ?$

---

---

## Experimento 2 (cont.)

- **Evento A:** soma dos dados é 8  
 $A = \{(2, 6), (6, 2), (3, 5), (5, 3), (4, 4)\} \rightarrow P(A) = 5/36$
  - **Evento B:** primeiro dado é 3  
 $B = \{(3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6)\} \rightarrow P(B) = 6/36$
  - **Evento interseção:**  
 $A \cap B = \{(3, 5)\} \rightarrow P(A \cap B) = 1/36$
  - $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B) = (1/36) / (6/36) = 1/6$
  - A e B independentes?
  - A e B mutuamente exclusivos?
- 
-

## Experimento 2 (cont.)

- **Evento A:** soma dos dados é 8  
 $A = \{(2, 6), (6, 2), (3, 5), (5, 3), (4, 4)\} \rightarrow P(A) = 5/36$
  - **Evento B:** primeiro dado é 3  
 $B = \{(3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6)\} \rightarrow P(B) = 6/36$
  - **Evento interseção:**  
 $A \cap B = \{(3, 5)\} \rightarrow P(A \cap B) = 1/36$
  - $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B) = (1/36) / (6/36) = 1/6$
  - **A e B independentes?** Não, pois  $P(A|B) \neq P(A)$
  - **A e B mutuamente exclusivos?**
- 
-



## Exemplo (cont.)

- Evento A:

$$A = \{(2, 6), (6, 2), (3, 5), (5, 3), (4, 4)\} \rightarrow P(A) = 5/36$$

- Evento B: primeiro dado é 3

$$B = \{(3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6)\} \rightarrow P(B) = 6/36$$

- Evento interseção:

$$A \cap B = \{(3, 5)\} \rightarrow P(A \cap B) = 1/36$$

- $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B) = (1/36) / (6/36) = 1/6$

- A e B independentes? Não, pois  $P(A|B) \neq P(A)$

- A e B mutuamente exclusivos? Não, pois  $A \cap B \neq \emptyset$

---

---

# *Eventos sempre equiprováveis?*

- Experimento 3: Lançamento de uma moeda
  - Espaço amostral:  $E = \{\text{Cara}, \text{Coroa}\}$
  - Evento C: Cara  
 $C = \{\text{Cara}\}$
  - Elementos de E são equiprováveis?
  - $P(C) = ?$
- 
-

# *Visão frequentista de probabilidade*


- **Probabilidade:** frequência relativa de ocorrência do evento para um grande número de sorteios



# Frequência relativa

- C: Cara    O: Coroa

Resultado	C	C	C	O	C	O	O	O	O	O	O	C
Frequência acumulada de Caras	1	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5
Número de lançamentos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Freq. relativa de caras	1/1	2/2	3/3	3/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	5/12
%	100	100	100	75	80	67	57	50	44	40	36	42



# Exemplo: Distribuição de peso e pressão arterial

Pressão arterial	Peso			Total
	Excesso	Normal	Deficiente	
Elevada	0,10	0,08	0,02	0,2
Normal	0,15	0,45	0,20	0,8
Total	0,25	0,53	0,22	1

- $E=?$
- $P(\text{pressão elevada})=?$
- $P(\text{pressão elevada e excesso de peso})=?$
- $P(\text{pressão elevada}|\text{excesso de peso})=?$

# Exemplo: Distribuição de peso e pressão arterial

		pe	pn	pd	
	Pressão arterial	Peso			
		Excesso	Normal	Deficiente	Total
pae	Elevada	0,10	0,08	0,02	0,2
pan	Normal	0,15	0,45	0,20	0,8
	Total	0,25	0,53	0,22	1

- $E = \{(pae, pe), (pae, pn), (pae, pd), (pan, pe), (pan, pn), (pan, pd)\}$   
não equiprováveis
- $P(\text{pressão elevada}) = P(pae) = ?$
- $P(\text{pressão elevada e excesso de peso}) = P(pae \cap pe) = ?$
- $P(\text{pressão elevada} | \text{excesso de peso}) = P(pae | pe) = ?$

# Exemplo: Distribuição de peso e pressão arterial

- $E = \{(pae, pe), (pae, pn), (pae, pd), (pan, pe), (pan, pn), (pan, pd)\}$   
não equiprováveis
  - $P(\text{pressão elevada}) = P(pae) = 0,2$
  - $P(\text{pressão elevada e excesso de peso}) = P(pae \cap pe) = 0,10$
  - $P(\text{pressão elevada} | \text{excesso de peso}) = P(pae | pe) = ?$
- 
-



# Exemplo: Distribuição de peso e pressão arterial

Pressão arterial	Peso			Total
	Excesso	Normal	Deficiente	
Elevada	0,10	0,08	0,02	0,2
Normal	0,15	0,45	0,20	0,8
Total	0,25	0,53	0,22	1

- $E = \{(pae, pe), (pae, pn), (pae, pd), (pan, pe), (pan, pn), (pan, pd)\}$   
não equiprováveis
  - $P(pae) = 0,2$
  - $P(pae \cap pe) = 0,1$
  - $P(pae|pe) = 0,10/0,25 = 0,4$
- 
-

## *Exemplo: Distribuição de peso e pressão arterial (cont.)*

- Peso em excesso e pressão arterial elevada são eventos mutuamente exclusivos?
- Pressão arterial e peso são independentes?

Pressão arterial	Peso			Total
	Excesso	Normal	Deficiente	
Elevada	0,10	0,08	0,02	0,2
Normal	0,15	0,45	0,20	0,8
Total	0,25	0,53	0,22	1

## Exemplo: Distribuição de peso e pressão arterial (cont.)

- Peso em excesso e pressão arterial elevada são eventos mutuamente exclusivos?
  - Não, porque  $P(\text{pae} \cap \text{pe}) \neq \emptyset$
- Pressão arterial e peso são independentes?
  - Não, porque  $P(\text{pae}|\text{pe}) \neq P(\text{pae})$

Pressão arterial	Peso			Total
	Excesso	Normal	Deficiente	
Elevada	0,10	0,08	0,02	0,2
Normal	0,15	0,45	0,20	0,8
Total	0,25	0,53	0,22	1

# Exemplo: Qualidade de teste diagnóstico

Num estudo sobre a qualidade do teste ergométrico, Wrinner et al. (1979) compararam os resultados obtidos entre indivíduos com (D+) e sem (D-) doença coronariana.

- T+: teste positivo      T-: teste negativo
  - T+: mais de 1mm de depressão ou elevação do segmento ST, por pelo menos 0,08s, em comparação com paciente em repouso.
  - D+ e D-: angiografia (teste padrão ouro).
- 
-

# Exemplo: Qualidade de teste diagnóstico

Doença coronariana	Teste Ergométrico		
	T+	T-	Total
D+	815	208	1023
D-	115	327	442
Total	930	535	1465

Temos interesse em conhecer as **probabilidades de acerto** do teste:

- Probabilidade de teste positivo num paciente doente
- Probabilidade de teste negativo num paciente não doente

# Exemplo: Qualidade de teste diagnóstico

Doença coronariana	Teste Ergométrico		
	T+	T-	Total
D+	815	208	1023
D-	115	327	442
Total	930	535	1465

Temos interesse em conhecer as probabilidades de acerto do teste:

- Probabilidade de teste positivo num paciente doente  
 $P(T+|D+) = \text{sensibilidade} = s$
- Probabilidade de teste negativo num paciente não doente  
 $P(T-|D-) = \text{especificidade} = e$

# Exemplo: Qualidade de teste diagnóstico

Doença coronariana	Teste Ergométrico		
	T+	T-	Total
D+	815	208	1023
D-	115	327	442
Total	930	535	1465

Temos interesse em conhecer as probabilidades de acerto do teste:

- Probabilidade de teste positivo num paciente doente  
 $s = 815/1023 = 0,80$
- Probabilidade de teste negativo num paciente não doente  
 $e = 327/442 = 0,74$

## *Exemplo: Qualidade de teste diagnóstico (cont.)*

Do ponto de vista do médico que precisa fechar o diagnóstico além da sensibilidade e especificidade do teste é importante conhecer as seguintes probabilidades:

- Probabilidade de que uma pessoa com resultado positivo no teste realmente tenha a doença
- Probabilidade de que uma pessoa com resultado negativo no teste realmente não tenha a doença





## *Exemplo: Qualidade de teste diagnóstico (cont.)*

Do ponto de vista do médico que precisa fechar o diagnóstico além da sensibilidade e especificidade do teste é importante conhecer as seguintes probabilidades:

- Probabilidade de que uma pessoa com resultado positivo no teste realmente tenha a doença  
 $P(D+|T+)=VPP$
  - Probabilidade de que uma pessoa com resultado negativo no teste realmente não tenha a doença  
 $P(D-|T-)=VPN$
- 
-

# Exemplo: Qualidade de teste diagnóstico

Doença coronariana	Teste Ergométrico		
	T+	T-	Total
D+	815	208	1023
D-	115	327	442
Total	930	535	1465

Podemos obter VPP e VPN direto da tabela acima?

$$VPP = P(D+ | T+) =$$


$$VPN = P(D- | T-) =$$

# Teorema de Bayes

- Se  $D+$  e  $D-$  são eventos mutuamente exclusivos e exaustivos  $\Rightarrow P(D+ \cup D-) = P(D+) + P(D-) = 1$
- Pelo Teorema de Bayes:

$$P(D+|T+) = \frac{P(D+)P(T+|D+)}{P(D+)P(T+|D+) + P(D-)P(T+|D-)}$$


# Exemplo: Qualidade de teste diagnóstico



- $D+ \cap D- = \emptyset$
  - $D+ \cup D- = E$
  - Conhecidos:  $P(D+) = p$
- $P(T+|D+) = s$      $P(T-|D-) = e$

$$VPP = P(D+|T+) = \frac{P(D+ \cap T+)}{P(T+)} = \frac{P(T+ \cap D+)}{P(T+)}$$

# Exemplo: Qualidade de teste diagnóstico




- $D+ \cap D- = \emptyset$
- $D+ \cup D- = E$
- Conhecidos:  $P(D+) = p$

$$P(T+|D+) = s \quad P(T-|D-) = e$$

$$P(T+|D+) = \frac{P(T+ \cap D+)}{P(D+)} \Rightarrow P(T+ \cap D+) = P(T+|D+)P(D+)$$

$$VPP = P(D+|T+) = \frac{P(T+ \cap D+)}{P(T+)}$$

# Exemplo: Qualidade de teste diagnóstico




- $D+ \cap D- = \emptyset$
- $D+ \cup D- = E$
- Conhecidos:  $P(D+) = p$

$$P(T+|D+) = s \quad P(T-|D-) = e$$

$$VPP = P(D+|T+) = \frac{P(T+ \cap D+)}{P(T+)}$$

$$P(T+|D+) = \frac{P(T+ \cap D+)}{P(D+)} \Rightarrow P(T+ \cap D+) = P(T+|D+)P(D+) = s \times p$$

# Exemplo: Qualidade de teste diagnóstico



- $D+ \cap D- = \emptyset$
- $D+ \cup D- = E$
- Conhecidos:  $P(D+) = p$


$$P(T+|D+) = s \quad P(T-|D-) = e$$

$$VPP = P(D+|T+) = \frac{P(T+ \cap D+)}{P(T+)}$$

$$P(T+|D+) = \frac{P(T+ \cap D+)}{P(D+)} \Rightarrow P(T+ \cap D+) = P(T+|D+)P(D+) = s \times p$$

$$P(T+) = P[(T+ \cap D+) \cup (T+ \cap D-)]$$

# Exemplo: Qualidade de teste diagnóstico



- $D+ \cap D- = \emptyset$
- $D+ \cup D- = E$
- Conhecidos:  $P(D+) = p$

$$P(T+|D+) = s \quad P(T-|D-) = e$$


$$VPP = P(D+|T+) = \frac{P(T+ \cap D+)}{P(T+)}$$

$$P(T+|D+) = \frac{P(T+ \cap D+)}{P(D+)} \Rightarrow P(T+ \cap D+) = P(T+|D+)P(D+) = s \times p$$

$$P(T+) = P(T+ \cap D+) + P(T+ \cap D-)$$



# Exemplo: Qualidade de teste diagnóstico



- $D+ \cap D- = \emptyset$
- $D+ \cup D- = E$
- Conhecidos:  $P(D+) = p$


$$P(T+|D+) = s \quad P(T-|D-) = e$$

$$VPP = P(D+|T+) = \frac{P(T+ \cap D+)}{P(T+)}$$

$$P(T+|D+) = \frac{P(T+ \cap D+)}{P(D+)} \Rightarrow P(T+ \cap D+) = P(T+|D+)P(D+) = s \times p$$

$$\begin{aligned} P(T+) &= P(T+ \cap D+) + P(T+ \cap D-) \\ &= P(T+|D+)P(D+) + P(T+|D-)P(D-) \end{aligned}$$

# Exemplo: Qualidade de teste diagnóstico



- $D+ \cap D- = \emptyset$
- $D+ \cup D- = E$
- Conhecidos:  $P(D+) = p$


$$P(T+|D+) = s \quad P(T-|D-) = e$$

$$VPP = P(D+|T+) = \frac{P(T+ \cap D+)}{P(T+)}$$

$$P(T+|D+) = \frac{P(T+ \cap D+)}{P(D+)} \Rightarrow P(T+ \cap D+) = P(T+|D+)P(D+) = s \times p$$

$$\begin{aligned} P(T+) &= P(T+ \cap D+) + P(T+ \cap D-) \\ &= P(T+|D+)P(D+) + P(T+|D-)P(D-) \\ &= s \times p + (1-e) \times (1-p) \end{aligned}$$

# Exemplo: Qualidade de teste diagnóstico




- $D+ \cap D- = \emptyset$
- $D+ \cup D- = E$
- Conhecidos:  $P(D+) = p$


$$P(T+|D+) = s \quad P(T-|D-) = e$$

$$VPP = P(D+|T+) = \frac{P(T+ \cap D+)}{P(T+)} = \frac{s \times p}{s \times p + (1-e) \times (1-p)}$$

**s=0.8 e=0.74**



**s=0.8 e=0.74**



# Exemplo: Qualidade de teste diagnóstico

Doença coronariana	Teste Ergométrico		
	T+	T-	Total
D+	815	208	1023
D-	115	327	442
Total	930	535	1465

Podemos obter VPP e VPN direto da tabela acima?

$$VPP = P(D+ | T+) =$$

$$VPN = P(D- | T-) =$$

$$p = P(D+) = \frac{1023}{1465} = 0,70!!!$$

# Exemplo: Qualidade de teste diagnóstico – tabela fictícia

Doença coronariana	Teste Ergométrico			
	T+	T-	Total	
D+	469	117	586	s=0,8
D-	229	650	879	e=0,74
Total	698	767	1465	p=0,4

Podemos obter VPP e VPN direto da tabela acima?

$$VPP = P(D+ | T+) = 469 / 698 = 0,67$$

$$VPN = P(D- | T-) = 650 / 767 = 0,85$$